


แนวปฏิบัติเมื่อผลตรวจ ATK เป็นบวก และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

กรณีผลบวก



- ติดตามอาการโดย VDO call วันละ 1 ครั้ง
- เครื่องวัดไข้และออกซิเจนปลายนิ้ว
- ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ
- ส่งอาหารวันละ 3 มื้อ
- หากมีอาการเปลี่ยนแปลงแจ้งหน่วยบริการ เพื่อขอรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์
- ประสานส่งต่อโรงพยาบาล หากมีอาการรุนแรงขึ้น

กรณีเสี่ยงสูง

ผู้สัมผัสใกล้ชิดหมายเลข 0



- ผู้ที่เรียนร่วมห้อง, ผู้ที่นอนร่วมห้อง หรือ เพื่อนสนิทที่คลุกคลีกัน
- ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาที หรือ ถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย
- ผู้ที่อยู่ให้บริเวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ให้ห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วย และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาทีโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย

กรณีเสี่ยงต่ำ

ผู้สัมผัสที่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง



- สังเกตอาการ
 - เลี่ยงไปในที่ชุมชน
 - ให้มาเรียนได้
- โดยสวมแมสก์ตลอดเวลา
- รักษามาตรการ DMHTT



ถ้าหมายเลข 1 มีอาการ และตรวจพบเชื้อ จะกลายเป็นหมายเลข 0 และหมายเลข 2 ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย ATK วันที่ 3 หลังสัมผัสหมายเลข 1 และ Self-Quarantine 10-14 วัน นับจากวันที่หมายเลข 1 ตรวจ ATK พบเชื้อ (Positive)